

SIALORREA Y PAUTAS PARA EL CONTROL DEL BABEO



La sialorrea consiste en un exceso de saliva en la cavidad oral, ya sea por aumento de producción, ya por la dificultad en su deglución. (Palau Galindo, y cols, 2004)

Es un fenómeno que entra dentro de la normalidad en los niños de 18-24 meses durante el desarrollo neuromuscular oral y se considera patológico a partir de los 4 años. (López Tello y cols, 2012)

A menudo encontramos alumnos que tienen un control insuficiente de la musculatura orofacial y que tiene como resultado una excesiva producción de saliva y el consecuente babeo. Generalmente el tratamiento más utilizado para este exceso de saliva, se basa en fármacos, o en ejercitación muscular dentro de la intervención logopédica. Hoy en día, se están empezando a utilizar otras terapias en este ámbito, con el vendaje neuromuscular o kinesiotaping. Estudios recientes (De Riu, 2009, López Tello et al 2012) muestran su aplicación como técnica para el tratamiento de la sialorrea en niños.

Enlazamos unos artículos de interés para ampliar información sobre este tema.

<http://www.elsevier.es/es-revista-fisioterapia-146-articulo-eficacia-del-kinesiotaping-sialorrea-ninos-90161852>

<http://www.efisioterapia.net/articulos/posible-nuevo-metodo-reducir-sialorreareducir-sialorrea>

<http://www.aipro.info/drive/File/142.pdf>

Igualmente os informamos, que desde el equipo hemos elaborado un **documento con pautas útiles para realizar una intervención práctica**, como maestros de Audición y Lenguaje. En el caso que estuvierais interesados, no dudes en solicitar dicho documento al equipo.